

Alpes-Maritimes

Enquête Turdidés

BILAN 13/14



Saison 2013/2014


Préambule.

Depuis 12 ans la FDCAM propose un bilan annuel et des suivis des différentes populations de "turridés chassables" qui passent ou hivernent dans le département des Alpes-Maritimes.

La fiche enquête utilisée est remplie par des chasseurs volontaires. Il ne s'agit pas pour nous d'une enquête visant à connaître les prélèvements effectués dans le département (pour ce faire il faudrait que tous les chasseurs soient mis dans l'obligation de remplir une fiche et d'en assurer le retour à la Fédération). Notre but est d'avoir chaque saison :

- une vision de la répartition spatiotemporelle des 5 espèces de grands turridés chassables, grâce à l'établissement d'un **ICP** (Indice Cynégétique de Prélèvement) par espèce et par décade. Rappelons que le % d'individus d'une espèce dans les tableaux de chasse est révélateur de son importance à l'instant "T"
- une notion de la pression de chasse exercée sur l'ensemble des espèces considérées.

Au fil des années la localisation et le nombre de nos correspondants se sont stabilisés donnant à nos suivis une certaine fiabilité, il n'en reste pas moins que nous souhaiterions une couverture plus homogène de notre département. La médiocrité de cette saison est révélatrice d'un caractère très hétérogène de nos données 64% seulement de nos fiches font état d'au moins 1 prélèvement.



Nous tenons à remercier les Présidents de Sociétés, qui sont les relais et les moteurs de toutes nos enquêtes, mais c'est aux chasseurs qui nous font parvenir maintenant très régulièrement leur fiche "relevé des sorties de chasse turridés", que va toute notre gratitude.

Sans eux la FDCAM ne disposerait pas d'un dossier de référence dont la présentation pourrait s'avérer nécessaire pour défendre nos traditions cynégétiques. En particulier dans le cas où l'une des espèces de "turridés chassables" serait classée dans un statut de "conservation défavorable", en raison du risque de "confusion", nous aurions à faire face à des conséquences désastreuses sur la pratique de la chasse de **tous** les turridés.


Tableau des données de base pour l'établissement du bilan de la saison 2013/2014

ALPES MARITIMES - PRELEVEMENTS TURDIDES																					
Nombre de relevés reçus : 111										Nombre de relevés exploitables : 69										% SORTIES	% ICP
13-14	Nb sorties	Draine			Litorne			Musicienne			Mauvis			Merle			Tous	ICP sorties			
		Nb	%	ICP	Nb	%	ICP	Nb	%	ICP	Nb	%	ICP	Nb	%	ICP	TOTAL				
3ème décade	4	0	0	0,0	0	0	0,0	4	80	1,0	0	0	0,0	1	20	0,3	5	1,3	0,3		
Septembre	4	0	0	0,0	0	0	0,0	4	80	1,0	0	0	0,0	1	20	0,3	5	1,3	0,3		
1ère décade	31	9	17	0,3	2	4	0,1	32	60	1,0	8	15	0,3	2	4	0,1	53	1,7	2,7		
2ème décade	146	17	3	0,1	6	1	0,0	494	77	3,4	84	13	0,6	44	7	0,3	645	4,4	12,6		
3ème décade	68	7	3	0,1	3	1	0,0	165	71	2,4	30	13	0,4	27	12	0,4	232	3,4	5,9		
Octobre	245	33	4	0,1	11	1	0,0	691	74	2,8	122	13	0,5	73	8	0,3	930	3,8	21		
1ère décade	57	4	2	0,1	2	1	0,0	117	71	2,1	16	10	0,3	25	15	0,4	164	2,9	4,9		
2ème décade	49	13	11	0,3	1	1	0,0	74	64	1,5	13	11	0,3	14	12	0,3	115	2,3	4,2		
3ème décade	52	4	3	0,1	0	0	0,0	92	71	1,8	12	9	0,2	22	17	0,4	130	2,5	4,5		
Novembre	158	21	5	0,1	3	1	0,0	283	69	1,8	41	10	0,3	61	15	0,4	409	2,6	14		
1ère décade	59	1	1	0,0	0	0	0,0	91	78	1,5	16	14	0,3	8	7	0,1	116	2,0	5,1		
2ème décade	56	3	5	0,1	1	2	0,0	19	32	0,3	13	22	0,2	23	39	0,4	59	1,1	4,8		
3ème décade	60	8	4	0,1	2	1	0,0	141	75	2,4	20	11	0,3	16	9	0,3	187	3,1	5,2		
Décembre	175	12	3	0,1	3	1	0,0	251	69	1,4	49	14	0,3	47	13	0,3	362	2,1	15		
1ère décade	65	5	3	0,1	1	1	0,0	150	79	2,3	18	9	0,3	17	9	0,3	191	2,9	5,6		
2ème décade	93	6	2	0,1	1	0	0,0	227	84	2,4	12	4	0,1	24	9	0,3	270	2,9	8,0		
3ème décade	106	17	5	0,2	2	1	0,0	285	80	2,7	22	6	0,2	31	9	0,3	357	3,4	9,1		
Janvier	264	28	3	0,1	4	0	0,0	662	81	2,5	52	6	0,2	72	9	0,3	818	3,1	23		
1ère décade	133	6	1	0,0	3	1	0,0	357	79	2,7	42	9	0,3	42	9	0,3	450	3,4	11,5		
2ème décade	182	38	5	0,2	5	1	0,0	561	74	3,1	86	11	0,5	69	9	0,4	759	4,2	15,7		
Février	315	44	4	0,1	8	1	0,0	918	76	2,9	128	11	0,4	111	9	0,4	1209	3,8	27		
ANNUEL	1161	138	4	0,1	29	1	0,0	2809	75	2,4	392	11	0,3	365	10	0,3	3733	3,2			
%		4			1			75			11			10					100	100,0	
Chasseur type																					
Nb de sorties :		17																			
Prélèvements :		54																			
Moyenne / sortie :		3,2																			
Mise à jour du : 08/07/2014																					


Rappel - Un relevé de sorties est considéré comme "exploitable" dès lors qu'il contient une sortie avec un prélèvement.

On retiendra que pour la saison 13/14 nos % sont calculés à partir d'un échantillon de 3733 oiseaux


Les espèces prélevées



Pression de chasse et prélèvements dans les 3 zones des Alpes-Maritimes en 2013/2014




Notre synoptique met en évidence que sans surprise et c'est une confirmation que la zone "Littoral" est la plus concernée par la chasse des turdidés. Pour le Haut Pays, qui lui est le *moins concerné*, nous avons un déficit de données qui rend, dans notre enquête, l'appréhension de la distribution spatiotemporelle en migration et en hivernage des différentes espèces moins fiable.




La présence de la musicienne baisse très curieusement dans la 2^{ème} décennie de décembre qui par contre enregistre un pic migratoire du merle et de la mauvis !


Un suivi décadaire de l'ICP par espèce et par zone peut apporter un éclairage supplémentaire.




Sa présence n'est régulière et significative que dans le Moyen Pays, le pic du début de saison dans le Haut Pays est sans doute plus le fait des sédentaires que des migratrices.




Elle est complètement absente dans le Haut Pays, très irrégulièrement présente en faible quantité (autour de 1%) dans le Moyen Pays et le Littoral.



C'est l'espèce phare du Littoral ainsi que du Moyen Pays, plus particulièrement pour ce dernier, en fin de saison.




La **mauvis**, absente du Haut Pays, très discrète dans le Moyen Pays on relève surtout présence très hétérogène sur le Littoral avec un pic fin décembre.




Une présence beaucoup moins marquée que d'habitude sur le Littoral ainsi que dans les 3 zones en début de saison (moins d'autochtones), au décours de la saison sa présence n'est correcte que dans le Moyen Pays.


La pression de chasse




Octobre pourtant mois de prédilection pour les chasseurs de turridés n'a pas, faute d'oiseaux, connu son aura habituelle. Par contre janvier mais surtout février qui, rappelons-le, ne compte que 2 décades de chasse ont connu une pression de chasse importante liée sans doute au phénomène de "chasse refuge" mais aussi à une plus grande présence d'oiseaux



Les prélèvements par sortie ne sont positifs qu'en octobre et en février ce qui met en évidence la qualité de la fin de saison.




On pourra noter l'importance et la brièveté du passage d'octobre (il fallait impérativement être présent en 2^{ème} décade de ce mois). En seulement 2 décades l'ICP de février égale celui d'octobre ! Le presque bon et le médiocre.



Dans cette transposition en % de l'ICA on constate que pour le chasseur des Alpes-Maritimes la saison se résume à 3 décades acceptables : la 2^{ème} d'octobre, la 1^{ère} et surtout la 2^{ème} de février.


Les SUIVIS

➤ Les espèces prélevées




Si la musicienne est l'espèce dominante quelle que soit la saison, la présence la plus régulière est l'apanage du Merle Noir. On remarquera cette saison la quasi absence de la litorne.

➤ % des sorties




Dans le graphique ci-dessus on voit que janvier reste globalement le mois où la présence sur le terrain est la plus forte, la chasse des turridés constitue bien une "chasse refuge" après la fermeture générale. On notera aussi que la récupération d'une date de fermeture au 20 février permet durant ce mois un exercice de la chasse plus homogène ; on voit nettement que cette saison malgré seulement 2 décades il se situe au 1^{er} rang de la pression de chasse mensuelle des turridés dans les AM.

Le suivi de l'ICP par sortie -




Le suivi du % de la pression de chasse a montré que septembre n'était jamais significatif donc dans le suivi de l'ICP mensuel on peut voir que c'est celui de février qui est le meilleur de par sa plus grande régularité.

➤ ICP annuel par chasseur préleveur.




C'est la plus mauvaise saison depuis le début de nos suivis dans les Alpes-Maritimes, elle est inférieure de 34 points par rapport à la moyenne.



Ce graphique complète le précédent. Le nombre de sorties est en rapport avec l'abondance des oiseaux et ce, particulièrement pendant les mois de janvier et février où la présence plus ou moins importante de chasseurs non spécialistes en dépend.


Relations entre pression de chasse et ICP

Si l'on met en parallèle la pression de chasse mensuelle (% de sorties) et les prélèvements mensuels (% ICP mensuels) on s'aperçoit qu'il y a une relation intime entre les deux comme le montre l'histogramme ci-dessous.



CONCLUSIONS

Nos "suivis interannuels" peuvent, chez les oiseaux migrateurs, nous apporter des informations permettant une meilleure connaissance de la dynamique des espèces ainsi que celle de leur répartition spatiale. Dans tous nos suivis il faut relativiser le mois de février qui, au début de nos enquêtes ne comptait qu'une décade et qui s'il en compte 2 depuis la saison 06/07, reste un mois "incomplet".



L'ICP décadaire est bien le reflet d'une saison plus que médiocre dans sa globalité caractérisée par un important mais très court pic migratoire 2^{ème} décade d'octobre et assez bon regroupement des oiseaux en février. Entre les deux, migration et hivernage sont extrêmement faibles à l'exception, comme toujours, de quelques très rares secteurs ponctuellement privilégiés.

Nos suivis montrent que depuis 3 saisons nous sommes en dessous de notre ICP moyen pourtant peu élevé. Bien que les statuts décennaires 2014 du "Bird Life" ne soient pas encore connus nous restons sur la reconnaissance d'un statut de conservation favorable pour les turdidés alors pourquoi cette diminution de leur présence sous nos cieux ?

- Nous vous renvoyons vers un article paru en Juillet 2010 dans la revue *"Chasse en Pays d'Azur"*, vous y trouverez l'explication de l'importance de la climatologie dans l'acte migratoire et en particulier celle de l'indice N.A.O qui lorsqu'il est négatif est défavorable aux migrations, ce qui est le cas ces dernières années.
- Nous signalons depuis quelques années, à l'occasion de nos bilans, le décalage qui s'est créé de par le réchauffement climatique entre l'époque de la maturation de la provende et celle des arrivées des migrants.
- Nous avons aussi évoqué, comme élément défavorable à l'hivernage, le "mitage" de nos territoires ainsi que pour la zone Littorale la concurrence avec l'espèce invasive dominante qu'est *"l'étourneau sansonnet"*.
- Nous avons constaté pour les turdidés comme pour d'autres espèces migratrices une "diminution" de plus en plus nette des distances migratoires. Là aussi la climatologie s'avère être un élément prépondérant, pourquoi migrer au loin quand le froid générateur de disette est absent à courte distance ? C'est la généralisation des **migrateurs à regret**.
- A propos du nombre semble-t-il croissant de ces "migrateurs à regret" le temps est peut-être venu de s'interroger sur la réalité chez les turdidés d'une hérédité épigénétique qui ferait que les parents transmettent à leur descendance les leçons de leur expérience, en l'occurrence ici une diminution de la nécessité migratoire.

Rien dans ce que nous venons d'évoquer n'est irréversible hormis peut-être le "mitage" de nos territoires, c'est pourquoi il est indispensable de continuer nos enquêtes qui sont concomitantes et

complémentaires aux travaux menés par l'IMPCF et aux connaissances apportées par l' "Observatoire National Cynégétique et Scientifique sur les Migrateurs Terrestres".


Si nos suivis montrent une diminution quantitative de la présence des espèces ils confirment aussi et surtout que l'équilibre de la répartition de chacune d'entre elles par rapport aux autres ne subit actuellement pas dans le temps de variations alarmantes.

Gérard AUROUSSEAU
Administrateur de la FDCAM
Le Service Technique de la FDCAM

ANNEXE

Nous vous proposons en annexe le suivi sur 10 saisons des prélèvements effectués à l'aide de "gluaux" dans les Alpes-Maritimes

Suivi des attributions et des prélèvements des turdidés chassables avec les "gluaux" dans les A.M (06)																
Saison	Nombre de communes	Nombre de poseurs	Nombre de prises	% autorisé	Nombre de prises capturées par espèces						% Réalisation	Réal Musicien	Réal Mauvis	Réal Litornes	Réal Draines	Réal Merle
					MUSICIENNES	MAUVIS	LITORNE	DRAINE	MERLE	TOTAL						
2004/2005	14	82	710	71	230	177	29	18		454	64	51	39	6	4	
2005/2006	14	88	780	78	203	206	49	32		490	63	41	42	10	7	
2006/2007	16	79	712	71	183	160	14	26		383	54	48	42	4	7	
2007/2008	15	77	753	75	218	172	44	21		455	60	48	38	10	5	
2008/2009	15	73	715	72	187	150	44	18		399	56	47	38	11	5	
2009/2010	15	78	685	69	185	127	17	20		349	51	53	36	5	6	
2010/2011	15	76	623	62	147	179	58	29		413	66	36	43	14	7	
2011/2012	15	70	563	56	192	137	30	30		389	69	49	35	8	8	
2012/2013	15	71	566	57	125	172	46	27		370	65	34	46	12	7	
2013/2014	15	71	611	61	130	84	12	16	10	252	41	52	33	5	6	4
A jour 06/02/2014																



On trouve ici la confirmation pour les Alpes-Maritimes de la très mauvaise saison 2013/2014 avec seulement **41%** de réalisation des attributions.

On notera que cette chasse traditionnelle avec des prélèvements en petite quantité répond bien à l'arrêté du 17 août 1989.